

Arbutus unedo L.

medronheiro, ervodo, ervedeiro

Ericaceae

Europa

Árvore perenifólia até 5 m de altura ou arbusto 1-3m, com copa arredondada;

tronco ereto e contorcido com ritidoma fendilhado destacando-se em tiras pequenas acastanhadas ficando cor de canela, ramos contorcidos; rebentos com pelos glandulosos;

folhas alternas, simples, oblongo-lanceoladas, ligeiramente coriáceas 4-11 cm de comprimento, serradas, brilhantes, quase glabras com pelos na base e pecioladas;

flores hermafroditas, actinomórficas, aromáticas, dispostas em panículas terminais, com corola branco-rosada, gomilosa, de cerca 9 x 7 mm, com cinco lobos curtos revolutos, caduca, e com cálice de cerca 1,5 mm, com sépalas unidas na base e lobos suborbiculares, ovário súpero, 10 estames com filetes vilosos e anteras com apêndices;

fruto baga sulcado-reticulada ou verruculosa, globosa, de cerca de 20 mm de diâmetro, inicialmente de verde a amarelada, vermelho-escura quando madura; de

maturação anual;

sementes pequenas numerosas.

Floração: outono-inverno. **Frutificação:** nov-jan.

Polinização: entomófila. **Propagação:** por semente e estaca.

Utilizações: melífera, ornamental, fruto comestível e para fabrico da aguardente de medronho.

Estatuto de Conservação (categorias da IUCN - versão IUCN 3.1): -

Nativa e vulgar em Portugal Continental. Cultiva-se como ornamental e em pomares para obtenção do fruto (medronho).

Localização no PBTA: Parcela 03, Parcela 10.

Autores: Teresa Vasconcelos, Ana Luísa Soares, Ana Raquel Cunha, Paulo Forte, Pedro Arsénio

ficha 11, versão 1, Julho de 2018



ritidoma fendilhado



flores em panículas terminais

ONDE SE ENCONTRA NO PARQUE?

