

Bauhinia variegata L.

pata-de-vaca-rosada, unha-de-vaca-rosada

Caesalpinaceae

China

Árvore caducifólia, até 10 m de altura, com copa arredondada, pouco densa, com floração antes do aparecimento das folhas;

tronco ereto, com ritidoma cinzento escuro, fendido nos exemplares velhos, ramos cinzentos glabros, raminhos esverdeados, puberulentos;

gomos pequenos, triangulares, encostados e botões fusiformes;

folhas alternas, simples, de limbo largamente obovado a obcordado, geralmente de 4-9 x 6-11 cm, palminérvea, ligeiramente aquilhada, base cordiforme e ápice bilobado até 1/3, com lobos arredondados, verde-escuro na página superior e na inferior mais clara, com pelos pequenos e nervuras amareladas, salientes, pecíolo 2-3,5 cm de comprimento com extremidades espessadas;

flores hermafroditas, aromáticas, zigomórficas, rosadas ou brancas (var. *candida* (Aiton) Corner.), quase sésseis, 3 a 6 reunidas em cachos axilares e terminais, com cálice espátáceo-bilobado, corola pseudopapilionácea com 8-12 cm de diâmetro, cinco pétalas, obovadas a oblanceoladas de 4-5 cm, 5 estames férteis de filetes curvos tão longos como as pétalas, 1-5 estaminódios, estilete curvo;

fruto vagem plana, 15-25 x 1,5-2 cm com valvas lenhosas, deiscente e com 10-15 sementes;

sementes suborbiculares, cerca de 10 mm de diâmetro, achatadas, acastanhadas.



flores cor-de-rosa e flores brancas



vagem jovem e na deiscência

Floração: mai. **Frutificação:** jul-out.

Polinização: entomófila. **Propagação:** por semente.

Utilizações: ornamental, alimentação humana, medicina tradicional.

Estatuto de Conservação (categorias da IUCN - versão IUCN 3.1) – LC (pouco preocupante).

Localização no PBTA: Parcela 10.

Autores: Teresa Vasconcelos, Ana Luísa Soares, Ana Raquel Cunha, Paulo Forte, Pedro Arsénio

ficha 83, versão 1, Abril de 2019

ONDE SE
ENCONTRA
NO PARQUE?

