

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna sumaúma, paineira-branca

Bombacaceae
Brasil, Argentina

Árvore caducifólia, até 35 m de altura, em que as flores aparecem geralmente antes das folhas, com copa ampla irregularmente arredondada;

tronco cinzento-esverdeado, estriado verticalmente (zonas fotossintéticas), dilatado na base, com acúleos cónicos, fortes e de cerca de 2 cm no tronco e ramos, mais afiados nos ramos mais jovens, com muitos anos a árvore geralmente perde os acúleos no tronco;

gomos evidentes correspondentes aos botões florais ovoides;

folhas alternas, palmatifolioladas, pecioladas (20 cm), com 5-7 folíolos de 12 x 4 cm, obovado-lanceolados, agudo-acuminados, glabros, verde-claros, brilhantes, peciululados, de margem serrada;

flores hermafroditas, grandes, em posição terminal solitárias ou aos grupos, com cálice campanulado-tubuloso, corola com 20 cm ou mais de diâmetro, 5 pétalas rosadas na metade apical, esbranquiçadas para a base e com máculas estreitas avermelhado-escuras na página superior, amareladas no centro na zona dos estaminódios rosados e pelos densos esbranquiçados, 5 estames de filetes compridos, brancos e unidos, envolvendo quase completamente o estilete;

fruto cápsula oblonga a elipsoide, verde, até 20 cm, áspera, de maturação anual e deiscente;

sementes muitas envolvidas por fibras sedosas brancas, a que dá o nome de paina ou sumaúma.



flor, gomos e folhas



fruto e ramos (com acúleos)

Floração: set-nov. **Frutificação:** jul-ago.

Polinização: anemófila. **Propagação:** por semente e estaca.

Utilizações: ornamental, matérias-primas (fibras para enchimento de almofadas e bonecos, óleo das sementes para fins alimentares e industriais).


Estatuto de Conservação (categorias da IUCN - versão IUCN 3.1): -

Localização no PBTA: Parcela 10.

Autores: Teresa Vasconcelos, Ana Luísa Soares, Ana Raquel Cunha, Paulo Forte, Pedro Arsénio

ficha 41, versão 1, Novembro de 2018

ONDE SE
ENCONTRA
NO PARQUE?



● *Ceiba speciosa*

0 100 200 400 Metros