

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl.
camecipáris-do-oregon

Cupressaceae

Estados Unidos da América

Árvore monoica, perenífolia, até 60 m de altura, com copa piramidal, compacta;

tronco com ritidoma acinzentado a castanho-avermelhado, ramos geralmente pendentes, raminhos curtos dispostos geralmente em planos horizontais;

folhas oposto-cruzadas, escamiformes, imbricadas, aplicadas, agudas, 0,1-0,2 cm, as faciais planas e as laterais naviculares, agudas, as da face superior geralmente mais escuras que as da face inferior dos ramos, centralmente glandulíferas (glândula resinosa);

flores unissexuais, as masculinas em estruturas purpúreas, terminais em raminhos laterais e **as femininas** com escamas carpelares com 1-6 óvulos, violáceo-esverdeadas;

frutificação gábulos pequenos, globosos, castanho-avermelhado por vezes glauco, 8-10 escamas peltadas, lenhosas com escudo subplano, curtamente mucronado ao centro, geralmente em grande número; de **maturação** bienal;

semente largamente aladas com tegumento coriáceo com resina, 2-5 sementes por escama fértil do gábulos.



ramos aplanados horizontais e flores masculinas



gábulos pequenos

Floração: fev.

Polinização: anemófila. **Propagação:** por semente.

Utilizações: ornamental, matérias-primas (madeira, óleos essenciais).

Estatuto de Conservação (categorias da IUCN - versão IUCN 3.1): NT (quase ameaçado).


Existem várias variedades com copa colunar e folhagem de cor variada.

Localização no PBTA: Parcela 10, Parcela 16.

Autores: Teresa Vasconcelos, Ana Luísa Soares, Ana Raquel Cunha, Paulo Forte, Pedro Arsénio

ficha 102, versão 1, Junho de 2019

ONDE SE
ENCONTRA
NO PARQUE?



● *Chamaecyparis lawsoniana*

