

A evolução do COVID-19 em Portugal

A evolução do número de casos positivos durante o ano de 2020 mostrou a existência de etapas distintas, que foram modeladas em três períodos, o referente aos primeiros quatro meses, até final de abril, o segundo referente aos meses de maio a setembro, com significado sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo, mas também no Algarve e um pouco no Alentejo, e um terceiro período, de agosto até final de dezembro de 2020, com um aumento muito significativo e depois um decréscimo ou desaceleração em todas as regiões. Um quarto período, com um aumento muito significativo, refere-se às primeiras semanas de 2021. Para cada um destes períodos e regiões foram ajustadas equações. A evolução semanal do número de casos nas diversas regiões ao longo de 2020 e início de 2021 pode ser observada na figura 1, indicando-se nessa figura também as curvas ajustadas referentes aos quatro períodos.




Figura 1. Evolução do número de casos totais confirmados no total do País e nas regiões, mostrando as médias semanais (linha dourada) e os modelos ajustados (a ponteados) nos três períodos considerados durante 2020 e no período inicial de 2021. Indica-se a ponteados a projeção das tendências para as duas semanas seguintes. O início de 2021 indica um aumento quase exponencial em todas as regiões, mas agora seguida de uma alteração muito significativa, com decréscimos em todas as regiões.

As equações ajustadas para os três períodos de 2020 e no período inicial de 2021 seguiram a forma geral:

$$N(t) = (a)^{(t-i)} (b)^{(t-j)}$$

N é o número de novos casos confirmados no dia t (desde 1 de janeiro de 2020), i e j são os dias estimados de início dos episódios e das respostas (desde 1 de janeiro de 2020), a é a taxa de infeção, e b o coeficiente de reação à infeção, sendo menor ou igual a 1. O valor de b=1 indica não haver reação.

Esta equação foi aplicada de forma independente aos diferentes períodos. Os valores dos coeficientes ajustados para os quatro períodos (até final de abril de 2020, entre maio e setembro, desde o início de outubro até final de 2020, e o início de 2021 são:

1º Período	i	j	a	b	R ²
Total	64,6	76,1	1,4590	0,9714	0,986
Norte	62,2	80,7	1,3156	0,9732	0,974
Centro	74,5	77,0	1,6355	0,9591	0,977
LVT	65,4	73,4	1,3950	0,9701	0,933
Alentejo	81,3	84,0	1,2899	0,9455	0,889
Algarve	79,4	79,4	1,6618	0,9309	0,922
Açores	82,3	82,3	1,5178	0,9090	0,921
Madeira	80,3	112,8	1,0932	0,7152	0,476

2º Período	i	j	a	b	R ²
Total	0,0	66,4	1,0483	0,9964	0,004
Norte	43,9	43,9	1,0244	1,0000	0,623
Centro	92,0	93,6	1,0220	1,0000	0,517
LVT	0,0	79,4	1,0513	0,9950	0,000
Alentejo	87,6	90,7	1,0167	1,0000	0,540
Algarve	76,6	79,1	1,0154	1,0000	0,532
Açores	156,5	221,3	1,0067	1,0000	0,292
Madeira	0,0	128,2	0,0000	0,8874	0,398

3º Período	i	j	a	b	R ²
Total	246,2	269,6	1,2442	0,9875	0,919
Norte	257,6	272,7	1,3076	0,9847	0,942
Centro	246,9	269,3	1,1622	0,9891	0,926
LVT	234,7	266,1	1,1601	0,9895	0,871
Alentejo	221,6	286,7	1,0586	0,9941	0,864
Algarve	247,4	268,0	1,1145	0,9885	0,652
Açores	152,8	312,0	1,0200	0,9953	0,876
Madeira	194,5	234,9	1,0199	1,0000	0,767

4º Período	i	j	a	b	R ²
Total	346,5	356,3	1,6288	0,9761	0,902
Norte	347,4	353,0	1,6614	0,9740	0,902
Centro	350,6	358,8	1,5876	0,9725	0,925
LVT	352,1	358,6	1,6756	0,9741	0,856
Alentejo	351,7	353,5	1,6296	0,9704	0,945
Algarve	352,3	359,0	1,4791	0,9707	0,941
Açores	358,2	360,5	1,6550	0,9530	0,944
Madeira	350,7	356,4	1,2715	0,9789	0,753

Os coeficientes das equações diferem nos quatro períodos identificados, podendo ser interpretados com análises mais detalhadas. De qualquer forma o ajustamento do modelo à evolução dos números nos quatro períodos e regiões, demonstrado pelos altos valores de R^2 , indica que as equações expressam bem a evolução verificada.

No último período, o 4º, desde o início de 2021 até agora, o valor do coeficiente i indica que o início deste episódio poderá ser ter ocorrido à volta dos dias 345-355, a 10-20 de dezembro, sendo os Açores a região em que começou mais tarde, por volta do dia 358, a 23 de dezembro. A diferença entre os coeficientes j e i indica que o tempo de reação variou consoante as regiões, desde um mínimo de 2 dias nos Açores para 15 dias na Madeira. Os valores do coeficiente a , que se referem à velocidade de contágio, são muito elevados, com máximos nas regiões Norte, LVT, ou Açores e um mínimo na Madeira. O valor do coeficiente b , agora já bem inferior a 1, distante da unidade indica a existência de decréscimos significativos em todas as regiões, em particular nos Açores, indicando ter sido aí a reação mais rápida e mais significativa.

A evolução do número de casos confirmados tem consequências nos internamentos e nos óbitos, mas essa relação modificou-se desde o primeiro período. As consequências dos novos casos confirmados podem medir-se pela pressão nos hospitais, através do número de internados, pela pressão nas unidades de cuidados intensivos, pelo número de internados nessas unidades e, finalmente, pelo número de óbitos. Esta é uma sequência lógica que podemos subdividir em fases.

A primeira relação a estabelecer é entre o número de novos casos confirmados e o número de internados. Esta relação foi estabelecida em anteriores relatórios para os diferentes períodos de 2020 e representada graficamente. Neste relatório optou-se por representar todo o período entre 1 de janeiro de 2020 e o dia 28 de fevereiro de 2021 num mesmo gráfico (Figura 2), com indicação de algumas datas particulares em que as tendências mostraram alterações significativas.




Figura 2. Relação entre a média semanal do número de novos casos confirmados desde 1 de janeiro de 2020 e o número médio semanal de internados nessa data.

Neste gráfico são visíveis diferentes períodos. O primeiro até ao início de setembro (esquerda em baixo) apresenta flutuações, mas, a partir daí, há um aumento linear do número de internados com o número de novos casos até 19 de novembro. De 19 de novembro a 28 de dezembro há uma diminuição de novos casos, mas uma manutenção do número de internados. partir de 28 de dezembro assiste-se de novo a um aumento do número de internados em função do número de novos casos parecendo retomar-se a tendência geral de que o número de internados seja próximo de metade do número de novos casos. A partir de 28 de janeiro a tendência é da diminuição do número de casos confirmados, já com reflexos muito significativos na diminuição do número de internados. É agora um período mais favorável, em resultado das medidas mais fortes de confinamento.

A segunda análise pode fazer-se entre número total de internamentos e número de internamentos em cuidados intensivos, gráfico que se representa na Figura 3.




Figura 3. Relação entre a média semanal do número de internamentos e internamentos em cuidados intensivos três dias depois desde 1 de janeiro de 2020.

Também aqui surgem os mesmos períodos. Depois de um primeiro período até 20 de abril e um decréscimo tanto do número total de internados como dos que estavam em cuidados intensivos até meio de agosto, a relação entre aquelas duas variáveis manteve-se constante até 22 de novembro tendo o número de total de internados variado durante o mês de dezembro sem alteração significativa do número em cuidados intensivos. A partir do início de 2021 parece manter-se a relação anterior, agora com cerca de 13% dos internados em cuidados intensivos. No início de fevereiro o número de internados começou a diminuir, já com reflexos na diminuição do número de casos em unidades de cuidado intensivo, descendo os números com a mesma relação com que tinham subido.

Finalmente, a mais importante relação será a que se estabelece diretamente entre o número total de internados e a média semanal do número diário de óbitos. A relação está ilustrada na Figura 4.




Figura 4. Relação entre a média semanal do número de internados desde 1 de janeiro de 2020 e a média semanal do número diário de óbitos.

Mais uma vez este gráfico é claro na indicação dos diferentes períodos. O primeiro período vai até 19 de abril, com um aumento do número de óbitos refletindo o número de internados e depois uma diminuição dos dois números até 18 de agosto. A relação entre o número de internados e o número de óbitos manteve-se genericamente a mesma entre 18 de agosto e 12 de novembro. Desde 12 de novembro a 28 de dezembro o número de óbitos manteve-se relativamente constante apesar de uma subida do número de internados até 5 de dezembro e de uma descida até ao final do ano de 2020. O início de 2021 parece retomar genericamente a tendência anterior. As últimas semanas indicam que a diminuição do número de internados já se refletiu muito positivamente na redução da mortalidade, descendo os números dos óbitos e dos internados de uma forma muito semelhante à que tinham aumentado em simultâneo.

Em conclusão, o aumento quase exponencial do número de casos sintomáticos detetados e o aumento consequente do número de internados e de óbitos justificou, em absoluto, que tivessem sido tomadas medidas mais fortes de contenção que estão agora, depois de 2-3 semanas, a produzir resultados positivos em todas as regiões.